

Studi In-silico Menghambat Enzim α -glukosidase pada Fitokimia yang Terkandung pada *Momordica charantia* Linn. (Pare) sebagai Terapi Diabetes

by Farida Anwari


Submission date: 02-Jan-2023 07:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 1987947017

File name: AKta_kimia.pdf (919.04K)

Word count: 2569

Character count: 15788



6

Studi *In-silico* Menghambat Enzim α -glukosidase pada Fitokimia yang Terkandung pada *Momordica charantia* Linn. (Pare) sebagai Terapi Diabetes

Marisca Evalina Gendokesumo¹, Galih Satrio Putra^{2*}, Farida Anwari³, Widianat Widianat⁴, Mauren Elysia⁴

15

¹ Department of Biological Pharmacy, Faculty of Pharmacy University of Surabaya, Surabaya, Indonesia

² Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Anwar Medika, Sidoarjo, Indonesia

³ Medical Laboratory Science, University of Anwar Medika, Sidoarjo, Indonesia

⁴ Yayasan Menoreh Indonesia, Surabaya Indonesia

*alamat email korespondensi : galih_satrio_putra@yahoo.co.id

Abstract

33

Momordica charantia Linn. (Pare) is a medicinal plant that is often used by Indonesian people to reduce hyperglycemia levels in patient with diabetes mellitus. Empirically Phytochemicals contained in *Momordica charantia* Linn. The bitter taste is believed to counteract the sweet effects of sugar (hyperglycemia). Therefore, this research aims to identify the compounds contained in *Momordica charantia* Linn. (Pare) such as cucurbitene, lanostene, momordicin derivatives, momordicoside derivatives, gonyoglycoside derivatives to inhibit the α -glukosidase through in-silico performed Molegro Virtual Docker (MVD) Ver.5.5 software which was compared with its native ligand and acarbose, The molecular docking results showed that the glycosides contained in *Momordica charantia* Linn had the potential to inhibit the α -glukosidase enzyme. One of them is momordicoside B (-192.74 Kcal/mol) which has a lower moldock score than its native ligands (-75.00 Kcal/mol) and acarbose (-151.73 Kcal/mol).

Keywords: *Momordica charantia* Linn. (Pare); in-silico; Molecular Docking; acarbose; α -glukosidase

Abstrak

26

Momordica charantia Linn. (Pare) adalah salah satu tanaman yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Secara empiris Fitokimia yang terkandung pada *Momordica charantia* Linn. yang berasa pahit dipercaya dapat melawan efek manis dari gula. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penghambatan enzim alfa glukosidase pada senyawa yang terkandung dari *Momordica charantia* Linn. (Pare) yaitu cucurbitene, lanostene, momordicin derivatives, momordicoside derivatives, gonyoglycoside derivatives dalam menghambat enzim α -glukosidase secara in-silico menggunakan Molegro Virtual Docker (MVD) Ver.5.5 yang dibandingkan dengan native ligandnya dan acarbose. Hasil in-silico menunjukkan bahwa glikosida yang

terdapat pada *Momordica charantia* Linn memiliki potensi menghambat enzim α -glukosidase. Salah satunya adalahnya *Momordicoside B* (-192.74 Kcal/mol) yang memiliki moldock score yang lebih rendah dibandingkan native ligannya (-75.00 Kcal/mol) dan acarbose (-151.73 Kcal/mol).

Kata Kunci: *Momordica charantia* Linn. (Pare); *in-silico*; Molecular Docking; acarbose; α -glukosidase

I. Pendahuluan

Menurut World Health Organization (WHO), diabetes melitus merupakan penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein [1,2]. Diabetes Melitus merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia [3] Pada tahun 2015 sebanyak 415 juta orang dewasa dengan diabetes, terjadi kenaikan 4 kali lipat dari 108 juta di tahun 1980an. Pada tahun 2040 diperkirakan jumlahnya akan menjadi 642 juta. Hampir 80% orang diabetes terdapat di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Salah satu nya adalah negara Indonesia. Di Indonesia penderita diabetes mellitus menempati peringkat ke tujuh di dunia bersama dengan Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko dengan jumlah estimasi orang dengan diabetes melitus 10 juta [4]

Penggunaan pare dengan nama latin *Momordica charantia* Linn. sebagai makan ataupun minuman dipercaya oleh masyarakat Indonesia dapat menurunkan kadar gula darah

dalam tubuh [5-7]. Terdapat suatu keyakinan secara turun-temurun bahwa penyakit kencing manis dapat dilawan diobati dengan sesuatu yang pahit yang sering disebut sebagai “jamu pahitan” [5]. *Momordica charantia* Linn. adalah salah satu dari jamu pahitan tersebut yang terbukti secara turun-temurun memiliki efek antidiabetes dan aman untuk digunakan [8]. Rasa pahit dari *Momordica charantia* Linn didapati adanya senyawa terpenoid yang terikat oleh gula yang dikenal sebagai glikosida [9]. Glikosida yang terkandung dalam pare diantaranya momordicin derivatives, momordicoside derivatives, goyaglycoside derivatives yang telah teridentifikasi struktur kimianya dengan baik [9] Beberapa penelitian menyebutkan glikosida yang terkandung dalam pare dapat menghambat enzim pemecah polysakarida menjadi monosakarida yaitu enzyme α -amilase dan α -glukosidase [10]

Jika melihat secara struktur kimia (gambar 1) *momordicin derivatives*, *momordicoside derivatives*, *goyaglycoside derivatives* memiliki kesamaan struktur kimia dengan acarbose yang menghambat enzim α -


glikosidase sehingga muncul dugaan bawah fitokimia yang terkandung didalam pare juga menghambat enzim α -glikosidase. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk studi secara *in-silico* dari kandungan fitokimia dari pare dalam menghambat enzim α -glikosidase yang dibandingkan dengan acarbose.

II. Metode Penelitian

Molecular Docking Study

Alat yang digunakan yaitu laptop AMD A6 Vision dengan spesifikasi CPU @ 1.4 GHz, 4 GB of RAM, dan *software* Chembiodraw version 11, Molegro Virtual Docker (MVD) Ver.5.5. *Software* Molegro Virtual Docker salah satu program berbayar

yang digunakan untuk *molecular docking study* dengan hasil kecocokan yang akurat mencapai diatas 90 % [11]. α -Glucosidase di unduh dari *protein data bank* (<http://www.rcsb.org/pdb>) dengan PDB ID : 3A4A [10;12]. *Phytochemichals* dari *Momordica charantia* Linn. (Pare) yaitu *cucurbitene*, *lanostene*, *momordicin derivatives*, *momordicoside derivatives*, *goyaglycoside derivatives* yang telah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik pada www.pubchem.com dan beberapa jurnal publikasi ilmiah [9]





Gambar 1. Kemiripan struktur acarbose dengan beberapa glikosida yang terkandung pada *Momordica charantia* Linn

Preparasi ligan cucurbitene, lanostene, momordicin derivatives, momordicoside derivatives, goyaglycoside derivatives dilakukan dengan cara menggambar 2 Dimensi ligan pada *software* ChembiDraw version 11. Ligand 2 Dimensi dilakukan *covert* menjadi ligand 3 Dimensi pada


software Chembio3D version 11. Ligan 3 Dimensi dilakukan perhitungan energi minimal yang paling stabil dengan cara perhitungan MMFF94 dan ligan disimpan dengan tipe file PDB. File [13].

Tabel 1. Fitokimia pada *Momordica charantia* Linn.yang ditambatkan pada enzim α -glukosidase







Momordicoside C




Momordicoside D




Momordicoside E




Momordicoside F1




Momordicoside F2




Momordicoside G




Momordicoside I




Momordicoside K




²
Goyaglycoside-a




Goyaglycoside-b




Goyaglycoside-c




Goyaglycoside-d




Goyaglycoside-e




Goyaglycoside-f




Goyaglycoside-g



Goyaglycoside-h



acarbose



Glucose (GLC_601)

Reseptor didapatkan dari *Protein Data Bank* (PDB) yang dipreparasi kembali dengan *software* Molegro Virtual Docker (MVD) Ver.5.5. α -glucosidase dan ligan pembandingnya yaitu glucose dilakukan proses *redocking* untuk memvalidasi *software* Molegro Virtual Docker (MVD) Ver.5.5. agar

8

DOI: <http://dx.doi.org/10.12962/j25493736.v7i1.12588>

dapat digunakan untuk mendocking senyawa *Phytochemistry* dari *Momordica charantia* Linn. (Pare).

Redocking bertujuan untuk memvalidasi PDB file yang diunduh dan *software* yang digunakan untuk metode docking senyawa yang diteliti *phytochemical* dari *Momordica*

30

82

charantia Linn. (Pare) dapat diperoleh hasil yang valid dan benar. Parameter penerimaan redocking adalah nilai *Root Mean Square Deviation* (RMSD) $< 2,0 \text{ \AA}$. Nilai RMSD menunjukkan kesesuaian koordinat ligan dari hasil kristalografi dibandingkan dengan koordinat ligan yang di redocking glucose pada α -Glucosidase sebesar 0.53 \AA yang sesuai dengan kriteria proses docking (Gambar 2).

Hasil docking yang diperoleh adalah *moldock score* yang diinterpretasikan sebagai prediksi


Docking terhadap Enzim α -Glucosidase

Docking senyawa *Phytochemicals* dari *Momordica charantia* Linn. (Pare) dengan

interaksi ikatan antara obat dan reseptor. *moldock score* yang semakin kecil menunjukkan besarnya tingkat keserasian antara ligan dan reseptor untuk berinteraksi. Hasil *docking* juga dapat divisualisasi dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran interaksi ikatan ligan dengan reseptor yang meliputi interaksi ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik dan interaksi elektronik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

menggunakan *software* Molegro Virtual Docker (MVD) Ver.5.5 diperoleh data yang disajikan pada Tabel 2.



Gambar 2. Visualisasi *redocking process* Glukosa pada α -Glucosidase dengan RMSD = 0.53 \AA


Tabel 2. Hasil Moldock score fitokimia yang terkandung dalam *Momordica charantia* Linn.

(Pare)


No	Phytochemicals	Moldock score (Kcal/mol)
1	Cucurbitene	124.71
2	Lanostene	148.41
3	Momordicin I	141.18
4	Momordicin II	-169.57
5	Momordicoside A	-110.38
6	Momordicoside B	-192.74
7	Momordicoside C	-139.48
8	Momordicoside D	-142.35
9	Momordicoside E	-167.12
10	Momordicoside F1	-139.68
11	Momordicoside F2	-146.33
12	Momordicoside G	-144.42
13	Momordicoside I	-169.49
14	Momordicoside K	-133.82
15	Goyaglycoside-A	-166.24
16	Goyaglycoside-B	-158.54
17	Goyaglycoside-C	-156.29
18	Goyaglycoside-D	-144.04
19	Goyaglycoside-E	-114.37
20	Goyaglycoside-F	-148.14
21	Goyaglycoside-G	-136.66
22	Goyaglycoside-H	-100.21
23	GLC_601	-75.00
24	Acarbose	-151.73
25	Maltosa	-96.17

Senyawa yang memiliki nilai docking yang paling rendah yaitu momordicoside B (-192.74 Kcal/mol) yang artinya senyawa momordicin II diprediksikan memiliki aktivitas menghambat enzim α -Glucosidase yang berperan untuk memecah disakarida (maltosa, isomaltosa, fruktosa) menjadi monosakarida (glukosa) yang dapat meningkatkan kadar gula darah dalam peredaran darah yang ditunjukkan pada gambar 3[15].

enzim α -Glucosidase adalah salah satu enzim yang dihasilkan di dalam usus manusia yang akan terangsang oleh adanya makanan yang masuk dalam saluran cerna. Obat yang digunakan untuk menghambat α -Glucosidase yaitu acarbose [1,2,14]. Acarbose dapat menurunkan kadar gula darah *postprandial* (setelah makan) dengan menghambat α -Glucosidase sehingga tidak dapat mengubah α -Glucosidase menjadi monosakarida seperti yang disajikan pada Gambar 4.



Gambar 3. Mekanisme α -Glucosidase Memecah Disakarida




Gambar 4. Mekanisme Acarbose Menurunkan Gula Darah

Kandungan fitokimia pada *Momordica charantia* Linn. (Pare) sangat banyak mengandung glukosida yang diprediksikan menghambat α -Glucosidase yang dipresiksikan memiliki mekanisme sama dengan acarbose [10,12]. Senyawa golongan glikosida seperti momordicin II, turunan momordicoside, dan turunan goyaglycoside memiliki moldock score yang lebih rendah di bandingkan dengan senyawa non-glukosida seperti Cucurbitene dan Lanostene yang diasumsikan bahwa senyawa glikosida yang terkandung pada *Momordica charantia* Linn. (Pare) memiliki aktivitas antidiabetes dengan

menghambat enzim α -Glucosidase disaluran cerna.

Dari semua glikosida yang terdapat pada *Momordica charantia* Linn. (Pare), turunan Momordicin, turunan Momordicoside, dan turunan goyaglycoside, senyawa momordicoside B diprediksikan yang paling kuat dalam menghambat α -Glucosidase di saluran cerna karena moldock scorenya lebih rendah dibandingkan native ligannya dan acarbose. Interaksi Ikatan hydrogen (garis biru) dan interaksi sterik (garis merah) senyawa momordicoside B dan acarbose pada α -Glucosidase dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 3.



Gambar 5. interaksi sterik (garis merah) dan ikatan hydrogen (garis biru) A. Momordicoside B. B. Acarbose dan C. Maltosa pada α -Glucosidase

Interaksi ikatan hidrogen yang terjadi pada maltosa dengan enzim α -Glucosidase pada asam amino Asp 69; Gln 182; Arg 213; Glu 277; Gln 279; Asp 352; Arg 442. Beberapa interaksi ikatan hydrogen tersebut juga ditemui Acarbose pada asam amino Asp 69; Arg 213; Asp 352; Arg 442. Beberapa interaksi ikatan hidrogen tersebut juga ditemui Momordicoside B pada asam amino Glu 277

dan 4 asam amino baru yang tidak ditemui pada maltosa yaitu Asp 215; Ser 304; Thr 310; Asp 325. Interaksi sterik senyawa Momordicoside B sangat kompleks dibandingkan acarbose dan maltosa yaitu pada asam amino 16 amino. Hal ini menyebabkan energi ikatan senyawa Momordicoside B lebih rendah dibandingkan senyawa lainnya dan senyawa Acarbose dan Maltosa.

Tabel 3. Data Interaksi asam amino senyawa Momordicoside B; Acarbose dan Maltosa pada enzim pada α -Glucosidase

Senyawa	Hydrogen bond	Steric interaction
Momordicoside B.	Asp 215	Asp 69
	Glu 277	Tyr 72
	Ser 304	His 112
	Thr 310	Tyr 158
	Asp 325	Phe 178
		Asp 215
		Val 216
		Gln 279
		His 280
		Asp 307
		Val 308
		Gly 309
		Arg 315
		Phe 321
	Asp 352	
	Arg 442	
Acarbose	Asp 69	Asp 69
	Arg 213	Tyr 72
	Asp 215	Tyr 158
	Asp 242	Lys 156
	Asp 352	Phe 159
	Arg 442	Phe 178
		Asp 215
		Glu 277
	Gln 279	
	Phe 303	
Maltosa	Asp 69	Asp 69
	Gln 182	Tyr 72
	Arg 213	His 112
	Glu 277	Asp 215
	Gln 279	Val 216
	Asp 352	
	Arg 442	

KESIMPULAN

Momordicoside B adalah glikosida yang terkandung dalam *Momordica charantia* Linn. (Pare) yang dipresiksikan sangat kuat menghambat α -Glucosidase lebih baik dari pada Acarbose sebagai antidiabetes.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Finkel, R., Clark, M.A., Cubeddu, L.X. 2009. Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology, 4th Edition. USA: Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health Inc.
- [2] A. J. Trevor., B. G. Katzung., M. Kruidering-Hall. Katzung & Trevor's Pharmacology Examination & Board Review 11th ed. 2015. The McGraw-Hill Companies: New York. ISBN: 978-0-07-182639-6
- [3] Pietrangelo, Ana. 2019. The Top 10 Deadliest Diseases. Healthline. <https://www.healthline.com/health/top-10-deadliest-diseases>
- [4] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI. <https://dinkes.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Laporan-Riskesdas-2018-Nasional.pdf>
- [5]. Joseph, Baby & Jini, D. 2013. Antidiabetic effects of *Momordica charantia* (bitter melon) and its medicinal potency. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 3(2): 93-102. doi:10.1016/S2222-1808(13)60052-3
- [6]. Ruswanto, Ruswanto., Mardianingrum, R., Lestari, T., Nofianti, T., Tuslinah, L., Normalik, D. 2018. In silico study of the active compounds in bitter melon (*Momordica charantia* L) as antidiabetic medication. Pharmacia. 8(2): 177-194. DOI: 10.12928/pharmacia.v8i2.8993
- [7]. Chanda, Ranabir., Samadder, A., Banerjee, J. 2019. Anti-diabetic Activity of *Momordica Charantia* or Bitter Melon: A Review. Acta Scientific Pharmaceutical Sciences 3(50): 24-30
- [8]. Abas, Razif., Othman, F., Thent, Z.C. 2014. Protective Effect of *Momordica charantia* Fruit Extract on Hyperglycaemia-Induced Cardiac Fibrosis. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Article ID 429060, 8 pages. <http://dx.doi.org/10.1155/2014/429060>
- [9]. Ahamad, Javed., Amin, S., Mir, S.R. 2017. *Momordica charantia* Linn. (Cucurbitaceae): Review on

- Phytochemistry and Pharmacology.
40
Res. J. Phytochem. 11:53-65. DOI:
10.3923/rjphyto.2017.53.65
- [10]. Shivanagoudra, Siddanagouda R.,
Perera, W.H., Perez, J. L., Athrey, G.,
Yuxiang Sun, Jayaprakasha, G.K., Patil,
B.S. 2019. Cucurbitane-type
compounds from *Momordica charantia*:
24
Isolation, *in-vitro* antidiabetic, anti-
inflammatory activities and in silico
modeling approaches. Bioorganic
Chemistry 87: 31–42.
35
<https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2019.02.040>
- [11] R.Thomsen & M. H. Christensen.
MolDock: A New Technique for High-
Accuracy Molecular Docking. J. Med.
Chem. 2006, 49, 3315-3321
- [12]. Yamamoto, K., Miyake, H., Kusunoki,
1
M., & Osaki, S. 2010. Crystal structures
of isomaltase from *Saccharomyces*
cerevisiae and in complex with its
competitive inhibitor maltose. FEBS
Journal, 277(20), 4205–4214.
1
doi:10.1111/j.1742-4658.2010.07810.x
- [13] Thomas HA. 1996. Merck Molecular
Force Field. I Basis, form, scope,
parametrization, and performance of
31
MMFF94. J. Com. Chem. 17(5-6): 490-
519
- [14]. Dipiro, J. T., Schwinghammer, T.L.
Wells, B.G, Dipiro, C.V, 2009.
Pharmacotherapy Handbook 7th
Edition. USA: The McGraw-Hills
Companies.
29
- [15]. R. K. Murray., D. K. Granner., P. A.
41
Mayes., V.W. Rodwell. 2003. Harper's
Illustrated Biochemistry, Twenty-Sixth
Edition. McGraw-Hill Companies: New
York. ISBN 0-07-138901-6. pp.100-110

Studi In-silico Menghambat Enzim α -glukosidase pada Fitokimia yang Terkandung pada Momordica charantia Linn. (Pare) sebagai Terapi Diabetes

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.tandfonline.com Internet Source	2%
2	git.embl.de Internet Source	1%
3	www.e-journal.unper.ac.id Internet Source	1%
4	en.wikipedia.org Internet Source	1%
5	Nelson Gaspersz, Matthew Adi Honey Amos, Sitti Hardiyanti Kalauw, Indrid Harjuni, Mario R. Sohilait. "Penambatan Molekuler Penghambatan Aktivitas Enzim α -Amilase dan α -Glukosidase oleh Senyawa Aktif Daun Kirinyuh (<i>Chromolaena odorata</i> L.)", KOVALEN: Jurnal Riset Kimia, 2022 Publication	1%
6	sinta.kemdikbud.go.id Internet Source	1%

7	eprints.ukh.ac.id Internet Source	1 %
8	halshs.archives-ouvertes.fr Internet Source	1 %
9	Submitted to Liverpool John Moores University Student Paper	1 %
10	Arnold Tóth. "A marketingkommunikáció és pénzügyi eredményességének mérése magyar borászatok körében", Corvinus University of Budapest, 2014 Publication	1 %
11	Heyu Shen, Jun Wang, Jingfang Ao, Yingying Cai, Meihua Xi, Yujie Hou, Mei Li, Anwei Luo. "Inhibitory kinetics and mechanism of active compounds in green walnut husk against α -glucosidase: Spectroscopy and molecular docking analyses", LWT, 2022 Publication	1 %
12	Levente Székely. "Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól", Corvinus University of Budapest, 2014 Publication	1 %
13	dergipark.org.tr Internet Source	1 %

14	id.123dok.com Internet Source	1 %
15	Avanti, Christina, Wouter L.J. Hinrichs, Angela Casini, Anko C. Eissens, Annie Van Dam, Alexej Kedrov, Arnold J. M. Driessen, Henderik W. Frijlink, and Hjalmar P. Permentier. "The formation of oxytocin dimers is suppressed by the zinc-aspartate-oxytocin complex", <i>Journal of Pharmaceutical Sciences</i> , 2013. Publication	1 %
16	worldwidescience.org Internet Source	1 %
17	www.neliti.com Internet Source	1 %
18	www.reference.com Internet Source	1 %
19	Razif Abas, Faizah Othman, Zar Chi Thent. " Protective Effect of Fruit Extract on Hyperglycaemia-Induced Cardiac Fibrosis ", <i>Oxidative Medicine and Cellular Longevity</i> , 2014 Publication	<1 %
20	Songjie Li, Ruimin Wang, Xiaoping Hu, Congfa Li, Lu Wang. "Bio-affinity ultra-filtration combined with HPLC-ESI-qTOF-MS/MS for screening potential α -glucosidase inhibitors	<1 %

from *Cerasus humilis* (Bge.) Sok. leaf-tea and in silico analysis", Food Chemistry, 2021

Publication

21

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

22

Muhammad Arba. "Pemodelan Farmakofor untuk Identifikasi Inhibitor Heat Shock Proteins-90 (HSP-90)", Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal), 2020

Publication

<1 %

23

drutama.wordpress.com

Internet Source

<1 %

24

Hua Sun, Dong Wang, Xiaotong Song, Yazhou Zhang et al. "Natural Prenylchalconaringenins and Prenylnaringenins as Antidiabetic Agents: α -Glucosidase and α -Amylase Inhibition and in Vivo Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Effects", Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017

Publication

<1 %

25

docplayer.info

Internet Source

<1 %

26

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

27

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1 %

28	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
29	ects.altinbas.edu.tr Internet Source	<1 %
30	ejournal.unib.ac.id Internet Source	<1 %
31	indonesianjpharm.farmasi.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
32	journal.stikmakassar.com Internet Source	<1 %
33	jurnal.stikesrsanwarmedika.ac.id Internet Source	<1 %
34	kar.kent.ac.uk Internet Source	<1 %
35	link.springer.com Internet Source	<1 %
36	smartlib.umri.ac.id Internet Source	<1 %
37	sport-pps.unud.ac.id Internet Source	<1 %
38	www.iptek.its.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.pjps.pk Internet Source	<1 %

40

Pedro Henrique Sette-de-Souza, Brenda Alencar Araújo Souza, Moan Jéfter Fernandes Costa, Fábio Andrey da Costa Araújo.

"Kuguacin: biological activities of triterpenoid from *Momordica charantia*—a scoping review", *Advances in Traditional Medicine*, 2021

Publication

<1 %

41

Mothe, C.G.. "Phase behavior of biodegradable amphiphilic poly(l,l-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(l,l-lactide)", *Thermochimica Acta*, 20060601

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 3 words

Exclude bibliography On